

## NOTE D'INFORMATION

# ÉVOLUTION DES MODALITÉS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

La Haute Autorité de Santé recommande le remplacement du frottis cervico-utérin par la recherche directe des papillomavirus (HPV) oncogènes pour le dépistage du cancer du col de l'utérus (CCU) chez les femmes de **30 à 65 ans**.

### — Nouvelles recommandations pour le dépistage du CCU

Les dernières recommandations HAS de juillet 2019 préconisent l'utilisation du test HPV en dépistage chez les **femmes de 30 à 65 ans**. Chez les femmes entre 25 et 30 ans, le dépistage reste fondé sur la réalisation du frottis cervico-utérin.

### — Intérêts du test HPV par rapport au frottis

→ **Meilleure sensibilité** pour la détection des cellules précancéreuses

→ **Efficacité accrue** en termes de réduction de l'incidence des lésions précancéreuses et des cancers invasifs chez la femme de plus de 30 ans.

**VOTRE LABORATOIRE EST VOTRE PARTENAIRE DANS CE DÉPISTAGE, IL POSSÈDE UNE EXPERTISE EN BIOLOGIE MOLÉCULAIRE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES SUR CETTE TECHNIQUE.**

### — Le test utilisé par votre laboratoire

Nous utilisons au laboratoire une technique sensible de biologie moléculaire (PCR) permettant de détecter les **14 types de HPV considérés à haut risque** (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 56, 58, 59, 66 et 68).

### — Quels prélèvements nous transmettre

La recherche des HPV oncogènes se fait directement sur un **prélèvement cervical**. Nous vous fournissons gratuitement le matériel nécessaire (PCR Cell Collection Media® et brosses de prélèvements). Vous pouvez toutefois nous transmettre le prélèvement sur les milieux actuellement utilisés pour la réalisation des frottis cervico-utérin : solution PreservCyt® ou Surepath®.


**VEUILLEZ CONTACTER VOTRE LABORATOIRE ESPACEBIO DE PROXIMITÉ POUR QU'IL VOUS FOURNISSE LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE.**

Les biologistes du laboratoire EspaceBio restent à votre disposition pour toute question ou tout renseignement complémentaire et vous remercient de votre confiance.





Algorithme de triage des femmes âgées de 30 à 65 ans auxquelles un test HPV a été proposé en dépistage primaire du CCU



\* résultat négatif pour une lésion intra-épithéliale ou maligne

**Référence :** HAS. Synthèse de la recommandation en santé publique. Evaluation de la recherche des papillomavirus humains (HPV) en dépistage primaire des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l'utérus et de la place du double immuno-marquage p16/Ki67. Juillet 2019